


VÍRUS ZIKA LIGADO A DEFEITOS DE NASCENÇA

O Vírus Zika, uma infecção relacionada com o nascimento de milhares de bebés com microcefalia, está a disseminar-se pelas Américas

PAÍSES MAIS AFETADOS



FACTOS SOBRE O VÍRUS

ORIGEM

Identificado no Uganda em 1947.
Causou surtos em África, sudeste Asiático e ilhas do Pacífico



SINTOMAS

Febre, erupção cutânea, dores articulares, olhos vermelhos. Uma em cada cinco pessoas infetadas tem doença moderada até uma semana



TRANSMISSÃO

Pela mordedura do mosquito aedes aegypti infetado



TRATAMENTO

Não há vacina nem tratamento. Doentes são aconselhados a repousar e ingerir muitos líquidos



PREOCUPAÇÕES


O vírus pode afetar o feto, resultando em cabeça reduzida ou microcefalia. As crianças assim nascidas têm dificuldades de aprendizagem ou morrem se o cérebro não desenvolver



BEBÉ COM MICROCEFALIA

Tamanho normal da cabeça de um bebé

Tamanho da cabeça com microcefalia



LIGAÇÃO DO ZIKA À MICROCEFALIA ESTÁ AINDA POR CONFIRMAR, MAS ALGUNS BEBÉS MORTOS TINHAM O VÍRUS NO CÉREBRO