

SARAMPO

DOENÇA ALTAMENTE CONTAGIOSA CAUSADA POR UM VÍRUS DO GRUPO PARAMYXOVIRUS. É AINDA UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE ENTRE CRIANÇAS, APESAR DE EXISTIR VACINA

CONTÁGIO

Faz-se por via aérea, através de gotículas ou aerossóis, como, por exemplo, pela inalação de partículas expelidas na tosse ou nos espirros



TRANSMISSÃO POR VIA AÉREA

Incubação 10 a 12 dias após exposição

Contágio 4 dias antes e até 4 dias após o início da erupção cutânea



2 HORAS

Vírus permanece ativo e com potencial para contágio durante pelo menos duas horas



134 200 MORTES

Em todo o Mundo, em 2015, morreram 134 200 pessoas. São 15 mortes por hora. A maioria tinha menos de 5 anos de idade

COMPLICAÇÕES COM ORIGEM NO SARAMPO

Encefalite

Inflamação do cérebro


Infeções nos ouvidos

Cegueira

Infeções respiratórias graves

Ex: Pneumonia

Diarreia severa e desidratação



SINTOMAS

- ▶ Febre alta
- ▶ Prostração
- ▶ Tosse
- ▶ Vermelhidão nos olhos
- ▶ Congestão nasal
- ▶ Sensibilidade à luz
- ▶ Erupções na pele
Semelhantes a borbulhas, associadas a comichão

EPIDEMIAS EM PORTUGAL

1987

12 000 casos

30 mortes notificadas

1993/94

3000 casos

0 mortes notificadas

2017

46 casos

21 confirmados, 15 suspeitos e 10 excluídos (análises deram negativo para sarampo)

1 morte notificada

ESQUEMA VACINAL RECOMENDADO EM 2017

DOENÇA	0 MESES	2 MESES	4 MESES	6 MESES	12 MESES	18 MESES	5 ANOS	10 ANOS	25 ANOS	45 ANOS	65 ANOS	10/10 ANOS
Hepatite B	VHB 1	VHB 2		VHB 3								
<i>Haemophilus influenzae B</i>		Hib 1	Hib 2	Hib 3		Hib 4						
Difteria, tétano, tosse convulsa		DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3		DTPa 4	DTPa 5					
Poliomielite		VIP 1	VIP 2	VIP 3		VIP 4	VIP 5					
<i>Streptococcus pneumoniae</i>		Pn13 1	Pn13 2		Pn13 3							
<i>Neisseria meningitidis C</i>					MenC 1							
Sarampo, parotidite epidémica, rubéola					VASPR 1		VASPR 2					
Vírus papiloma humano ¹								HPV 1,2				
Tétano, difteria e tosse convulsa ²										Tdpa - Grávidas		
Tétano e difteria ³									Td	Td	Td	Td

1 - Aplicável apenas a raparigas, com esquema 0, 6 meses
2 - Aplicável apenas a mulheres grávidas. Uma dose em cada gravidez

3 - De acordo com a idade da pessoa, devem ser aplicados os intervalos recomendados entre doses, tendo como referência a data de administração da dose anterior. A partir dos 65 anos, recomenda-se a vacinação de todas as pessoas que tenham feito a última dose Td há mais de 10 anos; as doses seguintes são administradas de 10 em 10 anos

PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO BALANÇO DOS 50 ANOS DO PLANO

ERRADICADA	ELIMINADAS	CONTROLADAS
1 Variola	5 Poliomielite, difteria, sarampo, rubéola, e tétano neonatal	7 Tétano, n. meningitidis C, H. influenzae B, hepatite B, parotidite epidémica, tosse convulsa e tuberculose